

ED治療戦略セミナー2011

泌尿器科クリニックで 行っている易しいED診療




かねとう腎泌尿器科クリニック
金藤 博行

2011.11.5 江陽グランドホテル

当院のED患者数


2003年5月～2011年9月 症例数 779名



* 2011年は9月までの人数

当院初診ED患者年齢分布

2003年5月～2011年9月 症例数 779名
年齢: 19 - 78歳 平均 46.3歳



ED診療の手順

1. 問診票
2. 血圧、脈拍測定
3. 診察：
 - 問診票の確認
 - 健診・ドックの結果確認
 - 合併症、内服薬の確認
 - 前立腺などの診察
4. 検査：必要時のみ血液検査（内分泌、肝機能など）
5. 治療：
 - 生活習慣についての指導 特に禁煙
 - PDE5阻害薬処方

生活指導、合併症の確認

- 生活習慣について
- 喫煙、アルコール
- 運動、体重コントロール
- 合併症：
 - ・循環器合併症（虚血性心疾患、不整脈）
治療中あれば主治医に確認
 - ・糖尿病、高血圧症、脂質異常症
必要に応じて内科紹介

ED治療薬

	投与量	効果発現時間	効果持続時間	食事の影響
バイアグラ	50mg	30分～1時間	4～6時間	あり
レビトラ	10mg			
シアリス	10mg	1時間以上	36時間	なし

PDE5阻害薬

	低用量	常用量	高用量
バイアグラ	25mg	50mg	
レビトラ	5mg	10mg	20mg
シアリス	5mg	10mg	20mg

当院で扱っている錠剤

初回： 4-6錠
再診時： 希望量

効果が不十分な場合の対応

1. 服薬の確認
 - ・食事とのタイミング
 - ・性的刺激のタイミング
2. 増量あるいは薬の変更
3. 性的刺激を続ける(リハビリテーション)
4. 生活習慣指導
5. 内分泌検査、採血(テストステロンなど)

待合室パンフレット

